




말라리아 주간소식지

Malaria Surveillance Weekly Report

2026년 26주차
(6.21.~6.27.)

www.kdca.go.kr



말라리아 환자 발생 현황

- ▶ '26년 1주부터 26주까지 말라리아 환자는 총 148명(인구 10만명당 발생률 0.27명)이며, 26주에 17명 발생
- ▶ 전체 148명 중 국내발생 108명(73.0%), 해외유입 40명(27.0%)으로 해외유입은 주로 아프리카에서 감염
- ▶ 전년 193명 대비 45명(23.3%) 감소

국내 발생 현황: 총 108명

- 성별** 남자 91명(84.3%), 여자 17명(15.7%)
- 연령** 전체 평균 연령 34.9세(범위 7~79세)이며, 20대 42명(38.9%)으로 가장 많았고, 40대 19명(17.6%), 30대 18명(16.7%), 60대 11명(10.2%), 50대·70대 각 8명(7.4%), 10대 이하 2명(1.8%) 순으로 발생
- 신분** 민간인 77명(71.3%), 현역군인 19명(17.6%), 제대군인 12명(11.1%) 순으로 발생
- 지역** 경기 60명(55.6%), 인천 20명(18.5%), 서울 14명(13.0%), 강원 6명(5.6%), 전남·경북 각 2명(1.9%), 대전·충북·충남·경남 각 1명(0.9%) 순으로 발생, 역학조사 결과 확인된 추정감염지역은 경기 68명(63.0%), 인천 19명(17.6%), 강원 10명(9.3%), 서울 6명(5.6%) 순으로 발생, 감염지역 조사 중 5명(4.6%)

말라리아 매개모기 감시 현황(25주)

- 매개모기지수** 평균 5.9개체 [평균 4.8개체 대비 1.1개체 및 전년 1.7개체 대비 4.2개체 증가]
- 원충보유조사** 총 165 pool (160 pool 음성, 5 pool 실험 중)

* 자료원: 질병관리청 방역통합정보시스템(잠정통계)

** 그 외 말라리아 발생 통계는 감염병포털(<https://dportal.kdca.go.kr/>)에서 확인 가능함

1

말라리아 환자 발생 현황

▶ **(전체)** '26년 26주차 기준 말라리아 환자는 총 148명으로, 전년 193명 대비 45명(23.3%) 감소

- **(국내발생)** 총 108명(26주 신규 17명), 전년 178명 대비 70명(39.3%) 감소
- **(해외유입)** 총 40명(26주 신규 없음), 전년 15명 대비 25명(166.7%) 증가

〈표 1〉 최근 5년간 말라리아 발생 현황

(단위: 명)

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 26주
전체	420	747	713	601	148
국내발생	382	673	659	545	108
해외유입	38	74	54	56	40


※ '26년 해외유입 국가: 에티오피아(18), 남수단(5), 코트디부아르(3), 수단(2), 우간다(2), 인도네시아(2), 탄자니아(2), 라이베리아(1), 시에라리온(1), 적도기니(1), 카메룬(1), 파푸아뉴기니(1), DR콩고(1)

〈표 2〉 전년 대비 최근 8주간 말라리아 발생 현황


(단위: 명)

구 분		19주	20주	21주	22주	23주	24주	25주	26주
2025년	누계	68	76	89	111	129	151	169	193
	주간 신규발생	5	8	13	22	18	22	18	24
2026년	누계	39	48	60	81	95	114	131	148
	주간 신규발생	11	9	12	21	14	19	17	17

※ 26주 누계: 2025년(1.1.~6.28.), 2026년(1.1.~6.27.)



〈그림 1〉 최근 5년간 환자 발생 추이



〈그림 2〉 전년 대비 주별 발생 추이

2 국내 발생 현황



▶ 성별·연령별 발생 현황

- (성별) '26년 전체 국내발생 말라리아 환자 108명 중 남자 91명(84.3%), 여자 17명(15.7%)
- (연령별) 전체 평균 연령 34.9세(범위 7~79세)이며, 20대 42명(38.9%)으로 가장 많았고, 40대 19명(17.6%), 30대 18명(16.7%), 60대 11명(10.2%), 50대·70대 각 8명(7.4%), 10대 이하 2명(1.8%) 순으로 발생

〈표 3〉 성·연령별 말라리아 국내발생 현황

(단위: 명(%))

구 분		2025년 (1. 1.~12. 31.)	전년 대비(26주)		
			2025년 (1. 1.~6. 28.)	2026년 (1. 1.~6. 27.)	증감 (%)
전체		545 (100)	178 (100.0)	108 (100.0)	△39.3
성별	남자	464 (85.1)	139 (78.1)	91 (84.3)	△34.5
	여자	81 (14.9)	39 (21.9)	17 (15.7)	△56.4
연령	0-9세	3 (0.6)	0 (0.0)	1 (0.9)	100.0
	10-19세	25 (4.6)	7 (3.9)	1 (0.9)	△85.7
	20-29세	172 (31.6)	64 (36.0)	42 (38.9)	△34.4
	30-39세	67 (12.3)	14 (7.9)	18 (16.7)	28.6
	40-49세	84 (15.4)	26 (14.6)	19 (17.6)	△26.9
	50-59세	84 (15.4)	30 (16.9)	8 (7.4)	△73.3
	60-69세	70 (12.8)	24 (13.5)	11 (10.2)	△54.2
	70세 이상	40 (7.3)	30 (16.9)	8 (7.4)	△73.3



〈그림 3〉 전년 대비 성별·연령별 국내 발생 분포

▶ 신분별 발생 현황

- '26년 전체 국내발생 말라리아 환자 108명 중 민간인 77명(71.3%), 현역군인 19명(17.6%), 제대군인 12명(11.1%) 순으로 발생

〈표 4〉 신분별 말라리아 국내발생 현황

(단위: 명(%))


구 분	2025년 (1. 1.~12. 31.)	전년 대비(26주)	
		2025년 (1. 1.~6. 28.)	2026년 (1. 1.~6. 27.)
전 체	545 (100.0)	178 (100.0)	108 (100.0)
민간인	407 (74.7)	120 (67.4)	77 (71.3)
현역군인	79 (14.5)	35 (19.7)	19 (17.6)
제대군인*	59 (10.8)	23 (12.9)	12 (11.1)

* 제대군인 기준: 최근 2년 이내 군 전역자


▶ 지역별 발생 현황

- (주소지 기준) 경기 60명(55.6%), 인천 20명(18.5%), 서울 14명(13.0%), 강원 6명(5.6%), 전남·경북 각 2명(1.9%), 대전·충북·충남·경남 각 1명(0.9%) 순으로 발생
- (추정감염지역 기준) 경기 68명(63.0%), 인천 19명(17.6%), 강원 10명(9.3%), 서울 6명(5.6%) 순으로 발생, 감염지역 조사 중 5명(4.6%)
- (시·군·구) 경기 파주시 38명, 경기 연천군 12명, 인천 강화군·강원 철원군 각 8명, 경기 김포시 7명, 경기 고양시 일산서구 6명 순으로 많이 발생

※ 추정감염지역은 심층역학조사로 변경될 수 있음('26.6.30.기준)



〈그림 4〉 말라리아 발생 분포(주소지 기준)



〈그림 5〉 말라리아 발생 분포(추정감염지역)

* 역학조사 진행 중인 5명 제외

〈표 5〉 말라리아 위험지역별 국내발생 현황

(단위: 명)

시·군·구			신고 환자수 (10만 명당 발생률*)		감염 추정**	시·군·구			신고 환자수 (10만 명당 발생률*)		감염 추정**
전 국			108	(0.21)	108	경기	20개		60	(0.44)	68
인천			10개	20	(0.66)	19	가 평 군		0	(0.00)	0
강 화 군			5	(7.22)	8	고양시 덕양구		3	(0.62)	0	
계 양 구			2	(0.72)	2	고양시 일산동구		2	(0.68)	1	
남 동 구			0	(0.00)	0	고양시 일산서구		5	(1.79)	6	
동 구			0	(0.00)	0	광 명 시		0	(0.00)	0	
미 추 홀 구			1	(0.24)	0	광 주 시		0	(0.00)	0	
부 평 구			3	(0.61)	2	구 리 시		0	(0.00)	0	
서 구			5	(0.78)	2	김 포 시		7	(1.45)	7	
연 수 구			3	(0.74)	3	남 양 주 시		0	(0.00)	0	
웅 진 군			0	(0.00)	1	동 두 천 시		0	(0.00)	0	
중 구			1	(0.59)	1	부 천 시		1	(0.13)	0	
서울			13개	14	(0.15)	6	시 흥 시		0	(0.00)	0
강 동 구			0	(0.00)	0	안산시 단원구		1	(0.34)	1	
강 북 구			0	(0.00)	0	안산시 상록구		0	(0.00)	0	
강 서 구			1	(0.18)	0	양 주 시		0	(0.00)	1	
관 악 구			1	(0.21)	1	연 천 군		7	(16.91)	12	
구 로 구			1	(0.26)	1	의 정 부 시		0	(0.00)	0	
금 천 구			0	(0.00)	0	파 주 시		29	(5.62)	38	
노 원 구			0	(0.00)	0	포 천 시		2	(1.43)	2	
도 봉 구			3	(1.00)	0	화 성 시		0	(0.00)	0	
마 포 구			1	(0.28)	1	기타 비위험지역 (23개)		3	(0.05)	0	
성 북 구			0	(0.00)	1	강원		6개	6	(0.40)	10
양 천 구			1	(0.23)	1	고 성 군		1	(3.72)	1	
영 등 포 구			1	(0.27)	1	양 구 군		0	(0.00)	0	
은 평 구			0	(0.00)	0	인 제 군		0	(0.00)	0	
기타 비위험지역 (10개)			5	(0.12)	0	철 원 군		4	(9.96)	8	
역학조사 미 실시					0	춘 천 시		0	(0.00)	0	
감염지역 조사중					5	화 천 군		1	(4.43)	1	
						기타 비위험지역 (10개)		0	(0.00)	0	
						그 외 지역***		8	(0.03)	0	

* 10만 명당 발생률: 2025년 시·군·구 연앙인구 기준

** 감염추정지역은 심층역학조사를 통해 변경될 수 있음('26.6.30.기준)

*** 서울, 인천, 경기, 강원 외 지역

3 말라리아 매개모기 감시 현황(25주)

- 감시시기: 4~10월(7개월)
- 채집지점: 88개 지점(서울특별시 29개, 인천광역시 18개, 경기도 27개, 강원 14개)
※ 질병관리청 감염병포털-실험소식지 '감염병 매개체 감시 주간소식지' 참고

▶ 25주차 매개모기자수

- 평균 5.9개체: 평년 4.8개체 대비 1.1개체 증가 수준
전년 1.7개체 대비 4.2개체 증가 수준

* 모기자수 = 채집 개체수 / 채집기 수 / 채집 일수

▶ 매개모기 내 원충보유 현황

- 24주: 66 pool (모두 음성)
- 25주: 165 pool (160 pool 음성, 5 pool 실험 중)


* 지역별로 채집된 말라리아 매개모기를 pooling하여 실험함(1 pool: 매개모기 1마리부터 최대 10마리까지 넣음)

〈표 7〉 최근 4주간 말라리아 매개모기 감시 현황

구 분		누 적 (14~25주)	최근 4주			
			22주	23주	24주	25주
말라리아 매개모기자수 (평균 개체)	평년(2023~2025년)	8.2	0.1	1.0	2.0	4.8
	전년(2025년)	3.4	0.1	0.2	1.2	1.7
	2026년	8.4	0.3	0.5	1.4	5.9

〈표 8〉 최근 4주간 말라리아 매개모기 비율

주 차	22주	23주	24주	25주
매개모기 비율(%)	5.0	7.5	13.3	28.1



〈그림 6〉 말라리아 매개모기 주별 발생(모기자수) 현황

말라리아로부터 나를 지키자! (현수막, 리플릿)

➤ 포스터, 리플릿, 현수막 관련 홍보자료 내려받기 > 질병청 누리집 > 알림·자료 > 홍보자료 > 홍보지
- <https://www.kdca.go.kr/gallery.es?mid=a20503020000&bid=0003>

➤ 현수막



➤ 리플릿 - 1p



▶ 리플릿 - 2p



말라리아란?

- 말라리아는 말라리아 원충에 감염된 모기가 사람을 흡혈하면서 전파되는 감염병입니다.
- 잠복기는 일반적으로 7~30일이지만 여러 요인으로 최대 2년 이내에 증상이 나타날 수 있습니다.
- 말라리아 매개모기는 봄에 출현하여 가을까지 활동하기 때문에 5월부터 10월까지 주의하여야 합니다.
- 매개모기는 주로 풀숲이나 축사 외벽, 벤치 아래 등에서 휴식하며 일몰 후부터 일출 전까지 활동합니다.



말라리아 발생현황

- 말라리아는 코로나-19 이후 해외여행, 야외활동 증가로 연 700명 내외 발생하고 있습니다.



말라리아 증상

- 말라리아에 감염되면 발열, 오한, 두통, 근육통, 피로 등 비특이적인 증상을 보입니다.
*가침, 가래를 동반하는 감기와 다름
- 특히 국내에 토착화된 삼일열 말라리아의 경우 48시간 간격으로 증상이 반복됩니다.


오한

심한 오한이
30분~2시간 정도 지속



발열

39℃ 이상 고열, 심한 두통,
구토가 수 시간 지속



발한

체온이 급격히 정상화되면서
땀이 난 후 지치고 졸림



- 해외에서 발생한 말라리아는 대부분 열대열 말라리아이며, 증상은 삼일열 말라리아와 비슷하지만 열발작이 주기적이지 않습니다.
- 그러나 열대열 말라리아의 경우 치료하지 않고 방치하면 중증으로 발전하여 24시간 이내 사망할 수 있기 때문에 신속한 치료가 우선입니다.



말라리아 위험지역

- 국내 말라리아는 접경 지역인 서울, 인천, 경기, 강원에서 주로 발생합니다.



- 최근 3년간 말라리아 다발생 지역은 경기(파주시, 김포시, 고양시, 연천군), 인천(강화군, 서구), 서울(강서구), 강원(철원군)입니다.

* 주소지 기준

